Discontinued
ISSUE #7

斯斯 不含 PPA 不含類固醇 鼻炎膠囊

スズレックス鼻炎カプセル

氣候變化，容易引起鼻炎，鼻過敏、打噴嚏、流鼻水、鼻塞、頭重等感冒初期症狀，造成鼻粘膜充血和呼吸道粘膜抵抗力減弱，請早服用以免導致二次感染。

成分	一膠囊中	主要作用
Pseudoephedrine HCl	60 mg	收縮鼻粘膜血管，解除鼻充血、鼻塞之症狀。
Chlorpheniramine Maleate	3 mg	打噴嚏、流鼻水、鼻塞、過敏性症狀之抑制。
Belladonna Total Alkaloids	0.13 mg	對淚眼、流鼻水，有緩解效用。
Monoammonium Glycyrrhizinate	20 mg	防止粘膜發炎、口乾。
Caffeine Anhydrous	40 mg	活動腦血管、緩和頭重及防止腦脹。

【適應症】
緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、眼睛及眼部搔癢)。

【用法用量】
成人及12歲以上兒童一次一粒，6歲以上未滿12歲的兒童一次1/2粒，3歲以上未滿6歲的兒童一次1/4粒，3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用，一天三次飯後服用。

【注意事項】
1.為防止兒童誤食請妥善保管。
2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3.除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警語】
1.除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得服用。
2.服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。
3.除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。
4.服用本藥不得與酒精性飲料合用。
5.除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。
6.除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心機能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀者不得服用。
7.老年人應小心使用本藥，3歲以下不建議服用。
8.如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用。
9.服用本藥後，可能引起倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見過敏反應（以幼兒及老年人較常見）。
10.連續服用本藥數日後，如果症狀沒有改善，應停藥立即就醫。
11.不得與其他含有抗組織胺成分或鼻充血解除成分之內服製劑共用（如綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮靜藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等）。
12.本藥含Pseudoephedrine HCl，應注意下列事項：
（1）除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病、高血壓、甲狀腺疾病、糖尿病、前列腺腫大引起之排尿困難者不得服用本藥。
（2）服用Monoamine oxidase inhibitor（MAOI）期間，或停用MAOI兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用之藥物是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。
13.本藥含咖啡因類成分，應限制再服用含咖啡因藥品、飲料（如：茶、咖啡、可樂等），過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。

【包裝】
6～21粒PTP鋁箔盒裝。

醫師藥師藥劑生指示藥品
衛署藥製字第032037號
GMP優良藥品G-1518號

ホーユー株式会社 商標授權
五洲製藥股份有限公司
經政府核定為cGMP優良藥廠
桃園縣新屋鄉赤欄村17-1號 UC-010-0911-3

FOREVER WINTER

Though retail food went up 12 percent, farmers got precious little of the extra income. In Wisconsin they staged a mass slaughter of 300 calves to protest low beef prices. They said the high cost of feed grain, driven up by heavy U.S. exports, no longer made it profitable for them to raise cattle.

I FOUND THESE IN BATHROOMS. I WAS DRUNK. I like THEM.

BLINDPIG (idealist)



DREAMLAND THEATRE (ON A NOISY VENT FAN)

PROJECT SUPERSOLDIER

WHATS YOUR EXUSE?

CRUST

MEAT HATS!

Human fe

MASTER B 8

COPY

COPY



↑DRAINAGE FROM a CYST!

Fumatul poate provoca o moarte lentă și dureroasă

Fumatul conduce la moarte de cancer pulmonar

Fumatul dăunează grav sănătății dumneavoastră și a celor din jur

DEAR TRAVELING PUNKS-

IT'S THAT TIME OF YEAR AGAIN. WHERE YOU START ROLLING INTO TOWN... TO THE HANDFULL THAT HAVE COME HERE TO BE CREATIVE & CONSTRUCTIVE, WE WELCOME YOU. TO THE KIDS THAT ARE HERE JUST TO DRINK, BREAK SHIT & CAUSE GENERAL CHAOS - FUCK OFF. WE DON'T NEED OR WANT YOU HERE. THIS IS OUR TOWN, YOU ARE A GUEST... CONTRIBUTE OR GO AWAY. ♥AZ Ⓔ(LWAYS)



SUMMIT PARTY SHOPPE
730 N MAIN
ANN ARBOR, MI 48104
734-761-8899

COPY
03/27/2010 22:42:06
EBT Sale:

Transaction # 10
Acc: **********5045
Entry: Manual
EBT Sal 6.66

3/10/10 9:07 PM


DIY
なる
Men Evolve
?


WAKE
UP

III

加強配方

普拿疼 [illegible]飲 散劑

Panad[illegible] dy Powder Extra Formula

用水沖泡後，熱[illegible]

Caffeine Anhydrous

Phenylephrine Hydroch[illegible]

Dextromethorphan Hydrobro[illegible]

Ascorbic Acid

【適 應 症】緩解感冒之各種症狀（鼻[illegible]痛、關節痛、肌肉酸痛）。

【使用方法】• 將一包伏冒熱飲倒入一般杯，

• 慢慢加入半杯溫開水，攪拌[illegible]

的八分滿），立即服用，熱飲[illegible]好加入冷水或溫水至約150c.c.（一般紙杯

【用法用量】成人(12歲以上)每4-6小時一包[illegible]；6歲以上未滿12歲，每次1/2包，一日3次；

3歲以上未滿6歲，每次1/4包，-[illegible]下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光曝射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下[illegible]
   (一)孕婦及哺乳婦不建議自行使用。[illegible]它藥品。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生[illegible]
5. 不得併服含酒精飲料。

【警　　語】

服用後，若有發作、發紅、噁心、嘔吐[illegible]、抖顫、視線模糊等症狀時，應停藥立即就醫。

1. 除非有醫師藥劑生指示，請遵照下列情況服用：
   (一)3歲以下不建議自行使用，(二)曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。
2. 不要服用超過建議劑量，因為劑量會產生束感、臉紅或失眠，兒童可能會產生誤動。
3. 不要服用本藥超過七日。
4. 服用本藥後，如果症狀沒有改善，或症狀惡化或有發燒、頭痛持續三日，應停藥立即就醫。
5. 服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續服用3日以上並伴有高燒，頭痛，噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
6. 酒精警語：若每日飲三杯或更多之酒精性飲料，請與醫師是否能服用本藥，因為Acetaminophen可能造成肝損害。
7. 本藥含【Phenylephrine hydrochloride】，應注意下列事項：
   (一)除非有醫師藥劑生指示，有心臟病、高血壓、甲狀腺疾病、糖尿病、前列腺腫大引起之排尿困難者不得服用本藥。
   (二)服用Monoamine oxidase inhibitor（MAOI）期間，或停用MAOI兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用之藥物是否含有MAOI，請詢問醫師藥劑師。
8. 本藥含Dextromethorphan，服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心，不要飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
   本藥含Dextromethorphan，服用Monoamine oxidase inhibitor（MAOI）或正清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑【Selective serotonin reuptake inhibitors（SSRI）】者，不得使用本藥。
9. 本藥含咖啡因成分，應該避免服用含咖啡因藥品、飲料（如：茶、咖啡、可樂等），過多的咖啡因會引起神經緊張、興奮與失眠，且常會引起心悸過速。

【包　裝】每盒盒中內裝5包單次沖泡之伏冒熱飲，每包含5克之粉狀藥劑。

【貯　存】30°C以下，密封貯存。

• 醫師藥師藥劑生指示藥品

• 衛署藥製字第050881號

通用藥害救濟制度

gsk GlaxoSmithKline

製　造／
葛蘭素威康史克藥廠股份有限公司台灣分公司
地址：台北市忠孝西路一段66號24樓
消費者免費服務專線：0800-212259
製造廠／
勝亞生技開發股份有限公司新竹二廠
地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號

L235-11